Методы органической химии

*Курс лекций для студентов
Химического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова*

*Автор и лектор
доктор химических наук
Дядченко В. П.*

Лекция 11

Алкоксигидриды алюминия и алкилгидриды бора

увеличение нуклеофильности,
а следовательно, и
восстанавливающей способности

Алкилгидриды бора

Супергидрид

L-Селектрид

LS-Селектрид

уменьшение нуклеофильности,
а следовательно, и
восстанавливающей способности

Алкоксигидриды алюминия

LTMA

LTEA

LTBA

Redal

Восстановление кетона под действием LTВА

K. Hensler, P. Wieland, Ch. Meystre, *Org. Synth. Coll. Vol. 5, 1973, p. 692*

Энантиомерные бинафтолы

R-(+)-изомер

S-(-)-изомер

Хиральные алюмогидридные восстановители

R-(+)-бинафтол
(1 моль)

S-(-)-бинафтол
(1 моль)

(R)-BINAL-H

(S)-BINAL-H

Нобелевская премия за 2001 г.

Ryoji Noyori

R. Noyori, I. Tomino, Y. Tanimoto, M. Nishizawa, *J. Am. Chem. Soc.*,
1984, v. 106, p. 6709

Одинаковы ли
выделенные
атомы водорода?

Молекула этилового спирта и однорукий молекулярный дизайнер

Ферментативное окисление этилового спирта

D. Arigoni, E. L. Eliel, *Top. Stereochem.*, 1969, v. 4, p. 127;
A. R. Battersby, J. Straunton, *Tetrahedron*, 1974, v. 30, p. 1707

Замещение атомов водорода в молекуле этилового спирта

Хиральные молекулы

Прохиральная молекула

прохиральный атом

Стохастическая (случайная) хиральность

Прохиральность

Атом, молекула,

сторона молекулярной плоскости,

предполагающие

возможность возникновения хиральности

при введении дополнительных заместителей,

называются *прохиральными*.

Дядченко В. П.

Концепция ТОПНЫХ ОТНОШЕНИЙ (ТОПИЗМ)

Дядченко В. П.

Дядченко В. П.
Дядченко В. П.

τοπος (место)

```
graph TD; A[τοπος (место)] --> B[Топология (раздел геометрии)]; A --> C[Топизм (теория графов)];
```

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ
(раздел геометрии)

ΤΟΠΙΣΜ
(теория графов)

Концепция топных отношений

Гомотопными

называются

атомы или группы атомов в молекуле

одинаковые по своей природе,

которые переводятся друг в друга

операцией симметрии

группы простых поворотных осей.

Молекулы с гомотопными атомами

Энантиотопными

называются

атомы или группы атомов в молекуле

одинаковые по своей природе,

которые переводятся друг в друга

только операцией симметрии

группы зеркально-поворотных осей

(плоскостью или центром симметрии).

Молекулы с энантиотопными группами

Энантиотопные атомы

Прохиральный атом

Прохиральный атом

**Атом углерода, связанный
с энантиотопными атомами
или группами атомов,
является *прохиральным*.**

Обозначение энантиотопных атомов

Замещение энантиотопных атомов в пропионовой кислоте

Диастереотопными

называются

атомы или группы атомов в молекуле

одинаковые по своей природе,

которые

не могут быть переведены друг в друга

никакой операцией симметрии.

Молекулы с диастереотопными группами

Энантотопными

являются две стороны

любой молекулярной плоскости,

которая одновременно служит

плоскостью симметрии молекулы

и не содержит копланарной оси симметрии.

Стороны
плоскости σ
ГОМОТОПНЫ

Стороны
плоскости σ
ЭНАНТИОТОПНЫ

Стороны
плоскости σ
ГОМОТОПНЫ

Стороны
плоскости σ
ЭНАНТИОТОПНЫ

Энантиотопные стороны

V. Prelog, S. Helmhen, *Helv. Chim. Acta*, 1972, v. 55, p. 2581.

Энантиотопные стороны

V. Prelog, S. Helmhen, *Helv. Chim. Acta*, 1972, v. 55, p. 2581

Действие ахирального реагента на субстрат с энантиотопными сторонами молекулярной плоскости

Действие ахирального реагента на энантиотопные стороны молекулярной плоскости

энантиомерные
переходные состояния

Энергия активации одинакова

Действие S-изомера хирального реагента на энантиотопные стороны плоскости

диастереомерные
переходные состояния

Энергия активации различна

Энантоселективная реакция

Ryoji Noyori, 1984

энантиомерный избыток

$$ee = \frac{M - m}{M + m} \cdot 100\% = \frac{97,5 - 2,5}{97,5 + 2,5} \cdot 100\% = 95\%$$

(R)- и *(S)*-изомеры бинафтола

***R*-(+)-бинафтол**

***S*-(-)-бинафтол**

Вид вдоль оси
связи **C(1')**-**C(1)**

Гомотопные атомы водорода

BINAL-H: атом Al не является асимметрическим

Модель Циммермана-Трэкслер
для реакций
Иванова и Реформатского

**Howard E. Zimmerman, Marjorie D. Traxler,
J. Am. Chem. Soc., 1957, v, 79, p. 1920**

Модель Циммермана-Трэкслер

R. Noyori, I. Tomino, Y. Tanimoto, M. Nishizawa,
J. Am. Chem. Soc., 1984, v. 106, p. 6709

выгодное “кресло”

невыгодное “кресло”

Случай (S)-BINAL-H

отталкивание
электронных облаков

Невыгодное
расположение реагентов

Выгодное
расположение реагентов

Энантиотопные стороны

V. Prelog, S. Helmhen, *Helv. Chim. Acta*, 1972, v. 55, p. 2581

Атака H^- с *re*-стороны

нафтольный фрагмент и группа Me удалены

(S)-бинафтол

Атака H^- с *si*-стороны

нафтольный фрагмент и группа Me сближены

Диастереомерные переходные состояния

(S)-бинафтол

выгодное расположение
реагентов

(S)-бинафтол

невыгодное расположение
реагентов

Энантоселективность

наблюдается в тех случаях,
когда **хиральный** реагент атакует
энантиотопные атомы субстрата
или **энантиотопные** стороны
молекулярной плоскости субстрата.
Альтернативные переходные состояния
при этом оказываются
диастереомерными.

Стереоселективность

**Энантио-
селективность**

**Диастерео-
селективность**

Энантоселективность:

из двух энантиомеров

преимущественно

образуется один.

**Создается абсолютная
конфигурация**

Энантоселективное восстановление

R. Noyori, I. Tomino, Y. Tanimoto, M. Noshizawa, *J. Am. Chem. Soc.*, 1984, v. 106, p. 6709

$$ee = \frac{97,5 - 2,5}{97,5 + 2,5} = 95\%$$

Энантоселективное восстановление

D. Seebach, M. A. Sutter, R. H. Weber, M. F. Züger, *Org. Synth. Coll. Vol. 7*, 1990, p. 215

$$ee = \frac{93 - 7}{93 + 7} = 86\%$$

На молекулярном уровне
хиральность нельзя создать,
её можно только размножить.

Реакции триацетокси-борогидрида натрия